

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 27 期

【中西医结合儿科学】

察目应首选观察的项目是

- A. 眼神
- B. 瞳孔
- C. 眼睑
- D. 巩膜
- E. 结膜

学员提问：为什么选 A

答案及解析：本题答案为 A

察目时首先观察的是眼神。若黑睛圆大、光亮灵活，为肝肾气血充沛；眼无光彩，二目无神，为病态；两目凝视，或直或斜，【医学教育网原创】多为肝风内动；瞳孔散大，对光反射迟钝，病多危重；瞳孔缩小，多为热毒内闭，见于中毒（有机磷、毒蕈或某些药物）。注意眼窝有无凹陷眼睑有无浮肿、下垂，结膜是否充血、巩膜是否黄染。

故本题答案选 A。

【中西医结合妇科学】

治疗痛经气滞血瘀证首选

- A. 调肝汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 清热调血汤
- E. 黄芪建中汤

学员提问：为什么选 B?

答案及解析：本题答案为 B。

痛经之气滞血瘀证。

证候：经前或经期小腹胀痛，拒按，经血量少，经行不畅，色紫黯有块，块下痛减，经前胸胁乳房胀满【医学教育网原创】或胀痛；舌紫黯或边有瘀点，脉弦或弦滑。

治法：理气活血，逐瘀止痛。

方药：膈下逐瘀汤加蒲黄。

故本题答案选 B。

### 【中西医结合内科学】

重度哮喘时，除吸氧外还应采取哪些措施

- A. 应用糖皮质激素、支气管扩张剂，维持水电解质平衡，控制感染
- B. 尽快找到过敏原，去除诱因，或进行脱敏疗法
- C. 大剂量抗生素及脱敏疗法
- D. 应用支气管舒张剂，色甘酸钠
- E. 吸入  $\beta_2$  受体激动剂，应用茶碱控释片，吸入糖皮质激素

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

部分中度和所有重度急性发作的治疗

1) 氧疗。

2) 速效  $\beta_2$  受体激动剂：初始治疗时连续雾化给药，随后根据需要间断给药（每 4 小时 1 次）。联合使用  $\beta_2$  受体激动剂和抗胆碱能制剂（如异丙托溴铵）能够取得更好的支气管舒张作用。

3) 茶碱：其支气管舒张作用弱于 SABA，不良反应较大应谨慎使用。对规则服用茶碱缓释制剂的患者，静脉使用茶碱应尽可能监测茶碱血药浓度。

4) 糖皮质激素：尽早使用全身激素，特别是对速效  $\beta_2$  受体激动剂初始治疗反应不完全或疗效不能维持，以及在口服激素基础上仍然出现急性发作的患者。

用法：泼尼松龙 30~50mg 或等效的其他激素，每日单次给药。严重的急性发作或口服激素不能耐受时，可采用静脉注射或滴注，如甲基泼尼松龙 80~160mg，或氢化可的松 400~1000mg 分次给药。静脉使用激素 2~3 天，继之口服激素 3~5 天。

5) 机械通气：机械通气指征：意识改变、呼吸肌疲劳、 $\text{PaCO}_2 \geq 45\text{mmHg}$  ( $1\text{mmHg}=0.133\text{kPa}$ ) 等。可先采用经鼻（面）罩无创机械通气，若无效及早行气管插管机械通气。哮喘急性发作机械通气需要较高的吸气压，可使用适当水平的呼气末正压（PEEP）治疗。

大多数哮喘急性发作并非由细菌感染引起，应严格控制抗菌药物的使用指征，除非有细菌感染的证据，或属于重度或危重哮喘【医学教育网原创】喘急性发作。

故本题答案选 E。

**【中西医结合外科学】**

药物浸泡消毒法中，器械消毒液更换的时间为

- A. 每天一次
- B. 隔日一次
- C. 每周一次
- D. 两周一次
- E. 每月一次

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

药物浸泡消毒法的注意事项：0.1%新洁尔灭或洗必泰每 1000ml 中，应加入亚硝酸钠 5g，可以防止金属生锈；器械消毒液应每周【医学教育网原创】更换 1 次。

故本题答案选 C。

**【针灸学】**

足太阴脾经的络穴是

- A. 隐白
- B. 太白
- C. 公孙
- D. 地机
- E. 三阴交

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

足太阴脾经的【医学教育网原创】络穴是：公孙。

故本题答案选 C。



医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 27 期（word 版下载）

