

主管护师：《答疑周刊》2020 年第 42 期

1. 【问题】胃溃疡与十二指肠溃疡的区别？

【解答】

项目	胃溃疡	十二指肠溃疡
疼痛性质	烧灼或痉挛感	钝痛、灼痛、胀痛或剧痛，或仅有饥饿样不适感
疼痛部位	剑突下正中或稍偏左	上腹正中或稍偏右
疼痛发作时间	进食后 30~60 分钟，疼痛较少发生于夜晚	进食后 1~3 小时，也常发生在午夜至凌晨
胃酸分泌	正常或降低	增多
疼痛持续时间	1~2 小时	饭后 2~4 小时，到下次进餐后为止
一般规律	进食—疼痛—缓解	疼痛—进食—缓解

2. 【问题】小脑幕切迹疝和枕骨大孔疝的区别？

【解答】

项目	小脑幕切迹疝（颞叶沟回疝）	枕骨大孔疝（小脑扁桃体疝）
病因	小脑幕上方的颞叶沟回、海马回通过小脑幕切迹向幕下移位	由小脑扁桃体经枕骨大孔向椎管内移位
典型表现	进行性意识障碍，患侧瞳孔先缩小→后散大，对光反射消失，对侧肢体瘫痪、肌张力增加、腱反射亢进、病理征阳性	缺乏特征性表现，有剧烈头痛，以枕后部疼痛为甚，反复呕吐，颈项强直或强迫体位，生命体征改变出现较早，意识障碍出现较晚，瞳孔可忽大忽小
处理原则	输入高渗脱水药，降低颅内压，争取尽快手术，去除病因	

3. 【问题】呕血与咯血出血量的区别？

【解答】

项目	呕血	咯血
出血量	隐血 (+) >5ml/d	少量 <100 ml/d
	黑便 50~70ml/d	中等量 100~500 ml/d
	呕血 250~300 ml/d	大量 >500 ml/d 或 >300 ml/次
病因	消化系统疾病引起	呼吸系统疾病引起

4.【问题】常见几种阴道炎的区别？

【解答】

项目	滴虫性阴道炎	外阴阴道假丝酵母菌病	萎缩性阴道炎
病因	滴虫，月经前后易发生	假丝酵母菌，条件致病菌	雌激素水平降低，阴道自净作用减弱
分泌物	稀薄泡沫状，白带呈黄绿色、血性、脓性且有臭味	干酪样白带或豆渣样白带；外阴、阴道奇痒	白带增多，分泌物稀薄，呈淡黄色，呈脓性，有臭味，血性
体征	阴道黏膜充血，严重时散在的出血点。后穹隆有呈黄绿色或脓性液性泡沫状分泌物	小阴唇内侧、阴道黏膜红肿并附着白色块状薄膜，外阴可见红斑、水肿，皮肤有抓痕	阴道皱襞消失，上皮菲薄，黏膜出血，表面可有散在小出血点或片状出血点
治疗	夫妻同治，甲硝唑	制霉菌素栓剂等栓剂置于阴道内，伊曲康唑	尼尔雌醇或小剂量雌激素
冲洗溶液	0.5%醋酸或 1%乳酸或 1:5000 高锰酸钾溶液	2%~4% 碳酸氢钠	0.5%醋酸或 1%乳酸
治愈标准	每次月经干净后复查 1 次，连续 3 个月经周期均是阴性	治疗后应在月经前复查白带，易复发	
护理	哺乳期妇女在用甲硝唑期间及用药后 24 小时内不宜哺乳；保持个人卫生；禁止性生活	性伴侣有症状同时治疗；保持个人卫生；积极治疗原发病	对卵巢切除、放疗病人给予雌激素替代治疗指导；保持个人卫生