

中医妇科学学习题

主讲：刘成之

1. 我国现存的第一部产科专著是

- A. 《妇人大全良方》
- B. 《景岳全书》
- C. 《经效产宝》
- D. 《女科要旨》
- E. 《脉经》

A. 《妇人大全良方》：宋·陈自明。

B. 《景岳全书》：明·张景岳。阳非有余，阴多不足。

C. 《经效产宝》：唐·昝殷。现存的第一部产科专著。

D. 《女科要旨》：清·陈修园。调经重脾胃，杂病效法金匱。

E. 《脉经》：未涉及。

2. 《妇人大全良方》的作者是

- A. 薛己
- B. 陈自明
- C. 赵献可
- D. 陈修园
- E. 张介宾

A. 薛己：明《校注妇人良方》

B. 陈自明：宋《妇人大全良方》

C. 赵献可：明《邯郸遗稿》

D. 陈修园：清《女科要旨》

E. 张介宾：明《景岳全书》

3. 阴道的功能是：

- A. 排出月经的通道
- B. 排恶露之出口
- C. 防御外邪入侵的第一道门户
- D. 阴阳交合的入口
- E. 娩出胎儿的产门

4. 子门是指

- A. 外阴
- B. 阴道口
- C. 阴道
- D. 宫颈口
- E. 子宫

5. 下列各项，不属于子宫功能的是

- A. 产生月经
- B. 排出月经
- C. 孕育胎儿

- D. 分娩胎儿
- E. 抵御外邪

6. 中医学女性生殖轴的概念是

- A. 脑-肾-天癸-胞宫
- B. 天癸-冲任-气血-胞宫
- C. 肾-天癸-气血-胞宫
- D. 肾-天癸-冲任-胞宫
- E. 天癸-肾-冲任-胞宫

7. 与月经产生关系最密切的脏腑是

- A. 心、肝、脾
- B. 肾、肺、脾
- C. 肾、肝、心
- D. 肾、肝、脾
- E. 心、肝、肺

其中肾最为关键。

8. 下列关于生理性带下的描述，错误的是

- A. 色白或无色透明
- B. 质地粘稠
- C. 其量适中
- D. 无特殊气味
- E. 从阴道内排出的一种阴液

9. 下列关于带下生理现象和作用的论述，错误的是

- A. 带下属津液
- B. 带下有周期性月节律
- C. 带下量随妊娠期增多
- D. 带下润泽胞宫、阴道
- E. 带下于经断后断绝

10. 下列关于妊娠期子宫的叙述，错误的是

- A. 子宫颈紫蓝色，质软
- B. 妊娠足月子宫容量约 5000ml
- C. 早孕 40 多天，可扪及子宫增大变软
- D. 妊娠足月子宫较正常子宫容量增加 100 倍
- E. 妊娠足月子宫较正常子宫重量增加 20 倍

11. 下列有关预产期计算的说法正确的是

- A. 以末次月经的第一天起计算
- B. 以月经的第一天起计算

- C. 以尿检阳性的第一天起计算
D. 以末次月经结束的第一天起计算
E. 月数加 9（或减 3）日数加 14

12. 下列说法错误的是

- A. 一次经血总量为 20--60ml
B. 月经周期 28~30 天
C. 经期为 3~7 天
D. 初潮约 14 岁
E. 经血无臭味，夹少量血块

经期	3~7 天，多数为 3~5 天	超 7 天以上，甚至半月方净，属经期延长
量色质 味	经量 20~60ml。 经色暗红，经质不稀不稠不凝固， 无血块，无特殊臭气	每个周期经量超过 80ml，属于月经过多 每个周期经量不足 20ml，属于月经过少 -----三不两无
经期表 现	行经前，胸乳略胀，小腹略坠，腰微酸，情绪易波动，一般经来自消，不作病论	
绝经	最后 1 次行经后，停闭 1 年以上，称为绝经。平均 49.5 岁（七七之年）	

13. 身体无病而月经 2 个月 1 次者称

- A. 季经
B. 并月
C. 漏胎
D. 垢胎
E. 避年

并月	两个月来潮一次
居经或季经	三个月一潮者
避年	一年一行者
暗经	终生不潮而却能受孕者
激经，或盛胎，垢胎 与激经鉴别	受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者

14. 妇科疾病的常见病因是

- A. 寒、热、湿邪
B. 风、热、暑邪
C. 寒、暑、湿邪
D. 寒、热、风邪
E. 风、热、湿邪

15. 月经量少，色淡暗，质稀，其辨证是

- A. 气虚证
B. 血虚证
C. 肾阴虚证

- D. 肾阳虚证
E. 肝肾阴虚证

气虚	月经提前, 量多 , 色淡质稀, 伴神疲乏力
血虚	月经延后, 量少 , 色淡红质稀, 伴头晕眼花
血热	月经量多, 或日久不止, 色深红质稠
血寒	月经延后, 量少色暗, 喜温畏寒(拒按)
血瘀	月经量多, 色紫暗, 质稠有血块
肝郁	月经提前或延后, 经量或多或少—— 波动感 伴胸胁作胀
肾虚	经量少, 色淡暗, 质稀 , 伴腰酸——(肾阳虚, 肾气虚)
实寒	月经延后, 经行下腹冷痛, 拒按 , 得热则减
虚寒	经行或经后下腹冷痛, 形寒畏冷, 喜按 , 得热则减

16. 产后乳汁甚少, 质稀薄, 面色无华, 其辨证是

- A. 血虚证
B. 脾虚证
C. 肾虚证
D. 肝肾亏虚证
E. 气血虚弱证

用**通乳丹**。

17. 带下色黄, 量多, 质黏稠, 其辨证是

- A. 血热证
B. 热毒证
C. 脾虚证
D. 肾虚证
E. 湿热证

带下的辨证:

阳虚	带下量多, 色白, 质清稀如水
阴虚夹湿	带下量多或不多, 色黄 , 或赤白带下, 质稠
脾虚	带下量多, 色淡黄或白, 质稀, 无气味, 伴神疲乏力
湿热	带下 量多, 色黄或黄白, 质黏腻, 有臭味
湿毒	赤白相间, 或黄绿如脓, 或五色杂陈
肾精亏虚, 天癸早衰, 任带虚损——带下量明显较少, 甚至无带下	

18. 月经病的治疗原则重在

- A. 补肾健脾
B. 益气养血
C. 治本调经
D. 疏肝养肝
E. 调理冲任

19. 中年妇女调经重在

- A. 治肝
- B. 益气
- C. 养血
- D. 治肾
- E. 治脾

20. (1) 患者月经先后无定期，经量或多或少，色紫红，有血块；胸胁、乳房、少腹胀痛，腕闷不舒，时叹息，暖气食少；苔薄白，脉弦。其证候是

(2) 患者月经先后无定期，经量或多或少，色暗红，有血块；经行乳房胀痛，腰膝酸软，精神疲惫；舌淡，苔白，脉弦细。其证候是

- A. 痰湿证
- B. 肝郁证
- C. 气滞证
- D. 肾虚证
- E. 气滞血瘀证

肝郁证	肾虚证	肝郁肾虚证
苔薄白或薄黄， 脉弦	舌淡，苔白，脉细弱	舌淡，苔白， 脉弦细
疏肝理气调经	补肾调经	补肾疏肝调经
逍遥散	固阴煎	定经汤

21. 月经先后无定期肝郁肾虚证的经血特点是

- A. 色红，质黏稠
- B. 色淡，质黏
- C. 色淡暗，质清稀
- D. 色淡暗，有血块
- E. 色红，有血块

22. 患者月经先后无定期，量少，色淡暗，质清；腰骶酸痛，头晕耳鸣，舌淡，苔白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 肾气丸
- B. 六味地黄
- C. 大补元煎
- D. 固阴煎
- E. 归肾丸

23. 月经先期的主要病机是

- A. 血热扰动血海
- B. 肝旺疏泄太过
- C. 肾虚封藏失职
- D. 血瘀致新血不得归经
- E. 气滞冲任不畅

24. 患者月经提前 10 天，量多，经色深红，质稠，经行不畅，有块，少腹胀痛，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔薄黄，脉弦数。其治法是

- A. 清热凉血调经
- B. 养阴清热调经
- C. 疏肝清热，凉血调经
- D. 疏肝健脾，养血调经
- E. 补脾益气，摄血调经

25. 患者月经周期提前 10 天，经血量多，色淡红，质清稀，神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，纳少便溏，舌淡红，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 肾气丸
- B. 归脾汤
- C. 固阴煎
- D. 人参养荣丸
- E. 清经汤

26. A. 补中益气汤 B. 逍遥散
C. 清经散 D. 加味逍遥散 E. 两地汤

(1) 患者经来先期，量多，色紫红，质黏稠，伴心烦，面红口干，小便黄，大便燥结，舌质红，苔黄，脉滑数。应首选的方剂是

(2) 患者经来先期，量少或量多，色红，质稠，伴两颧潮红，手足心热，咽干口燥，舌质红，少苔，脉细数。应首选的方剂是

27. 患者近 3 个月经期延后，量少，色淡，质稀，头晕气短，腰膝酸软，性欲淡漠，小腹隐痛，喜暖喜按，大便溏泄，小便清长，舌淡，苔白，脉沉迟无力。其治法是

- A. 扶阳祛寒调经
- B. 散寒祛瘀调经
- C. 温经散寒调经
- D. 温中散寒，补血调经
- E. 温中健脾，补血调经

28. 患者近一年月经周期延后，量少，色黯淡，质清稀，带下清稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗，舌淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 大补元煎
- B. 左归丸
- C. 温经汤（《金匱要略》）
- D. 当归地黄饮
- E. 八珍汤

29. 患者平素情绪抑郁，近 3 个月因情绪波动出现月经周期延后，量少，色黯红，有血块，小腹胀痛，精神抑郁，胸胁乳房胀痛，舌质正常，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 乌药汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 逍遥散
- D. 当归地黄饮
- E. 柴胡疏肝散

30. 下列各项，与月经先后无定期关系密切的脏腑是

- A. 心、肺
- B. 心、肝、脾
- C. 肝、脾、肾
- D. 肝、肾
- E. 肺、脾、肾

31. 患者经来先后无定，经量或多或少，色黯红，有血块；胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，暖气食少，苔薄白，脉弦。首选方剂

- A. 柴胡疏肝散
- B. 逍遥散
- C. 乌药汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 固阴煎

32. 下列各项，属月经过多气虚证的月经特点是

- A. 经行量多，色鲜红
- B. 经量时多时少，色深红，有小血块
- C. 经行量多，色淡红，质清稀
- D. 经行量多，色紫黯，有血块
- E. 经行量多或少，色淡红，质清稀

33. 患者经行量多，色紫黯，有血块，经行腹痛，平时小腹胀痛，舌紫黯有瘀点，脉涩。治疗应首选的方剂是

- A. 桃红四物汤
- B. 生化汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 失笑散加味
- E. 逐瘀止血汤

34. 月经过多血热证的治法是

- A. 益气养血，清热止血
- B. 清热凉血，养血调经
- C. 清热凉血，固冲止血
- D. 活血化瘀，止血调经
- E. 凉血止血，固冲调经

35. A. 补气摄血固冲 B. 清热凉血，固冲止血

C. 健脾益气，固冲止血 D. 活血化瘀止血

E. 补肾调经，固冲止血

(1) 患者经行量多，色紫黯，有血块，经行腹痛，平时小腹胀痛，舌紫黯，脉涩。其治法

(2) 患者经行量多，色鲜红，质黏稠，有小血块，伴口渴心烦，尿黄便结，舌红，苔黄，脉滑数。其治法是

36. 下列各项，需和月经过少鉴别的妇科疾病是

- A. 崩漏
- B. 带下病
- C. 激经
- D. 月经先后不定期
- E. 闭经

37. 月经过少血瘀证的月经特点是

- A. 经量点滴即净，色淡，质稀
- B. 经量渐少，色黯红，质稀
- C. 经量渐少，色黯淡，质稀
- D. 经行涩少，色紫黯，有血块
- E. 经行量少，色淡红，质黏腻如痰

38. 患者经行时间延长，量少，色鲜红，质稠；咽干口燥，潮热颧红；舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 清经散
- C. 丹栀逍遥散
- D. 举元煎加味
- E. 两地汤合二至丸

39. 下列各项，不属经间期出血脾气虚证主要症状的是

- A. 经间阴道少量出血，色鲜红，质稠
- B. 神疲体倦
- C. 气短懒言
- D. 食少腹胀
- E. 舌淡，苔薄，脉缓弱

40. 下列各项，属经间期出血血瘀证月经特点的是

- A. 经量少，色淡，质稀
- B. 经量稍多，色深红，质黏稠
- C. 经量少或多，色鲜红，质稠
- D. 经色紫黑或有血块
- E. 经量多，色淡，质黏稠

41. 下列各项，属崩漏的主要病机是

- A. 冲任不固，不能制约经血
- B. 血瘀瘀阻冲任

- C. 脾虚气不统血
- D. 肾虚封藏失职
- E. 血热迫血妄行

42. 治疗崩漏的治崩三法是

- A. 塞流、澄源、复旧
- B. 疏肝、健脾、补肾
- C. 补肾、疏肝、健脾
- D. 止血、澄源、复旧
- E. 止血、固冲、补肾

43. 下列各项，属崩漏虚热证的经血特点是

- A. 经血非时而下，经色黯，有血块
- B. 经血淋漓不尽，血色淡，质清稀
- C. 经来无期，量多势急，血色鲜红
- D. 经血势多如崩，色淡红，或淡黯，质清稀
- E. 经血淋漓不尽，色淡红，质清稀

44. 患者经血非时而下，量时多时少，时出时止，经色黯，有血块，小腹疼痛，舌质紫黯，尖边有瘀点，脉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 固冲汤
- B. 逐瘀止血汤
- C. 桃红四物汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 失笑散

45. 患者经乱无期，停闭数月后又突然暴崩下血，经色鲜红，质稍稠，头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，夜寐不宁，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 补肾丸
- B. 六味地黄丸
- C. 上下相资汤
- D. 左归丸合二至丸
- E. 当归地黄饮

- 46. A. 上下相资汤 B. 固阴煎
- C. 清热固经汤 D. 两地汤 E. 固冲汤

(1) 患者经来无期，淋漓日久难止，血色深红，质稠，口渴烦热，便秘溺黄，舌红，苔黄，脉滑数。首选的方剂是

(2) 患者经来无期，量少淋漓不尽，血色鲜红，面颊潮红，烦热少寐，咽干口燥，便秘，舌红，少苔，脉细数。首选的方剂是

47. 患者因与家人生气后出现月经停闭不行，胸胁、乳房胀痛，精神抑郁，少腹胀痛拒按，烦躁易怒，舌紫黯，有瘀点，脉沉弦而涩。其治法是

- A. 疏肝理气，活血通经
- B. 理气活血，调理冲任
- C. 健脾疏肝，活血通经
- D. 理气活血，祛瘀通经
- E. 健脾疏肝，调理冲任

48. 患者形体肥胖，近半年月经延后，经量少，色淡质黏腻，渐至月经停闭，胸闷泛恶，神疲倦怠，纳少痰多，色白，苔腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

- A. 二陈汤合苍附导痰汤
- B. 启宫丸合四君子汤
- C. 四君子汤合二陈汤
- D. 二陈汤合启宫丸
- E. 四君子汤合苍附导痰汤

49. A. 肾气亏损证 B. 气血虚弱证
C. 阴虚血燥证 D. 气滞血瘀证 E. 寒凝血瘀证

(1) 患者 18 岁月经来潮，近 1 年月经周期延后，经量减少渐至月经停闭，体质虚弱，全身发育欠佳，腰腿酸软，头晕耳鸣，倦怠乏力，夜尿频多，舌淡黯，苔薄白，脉沉细。其证候是

(2) 患者近半年出现月经周期延迟，量少，色淡红，质薄，渐至经闭不行，神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄，舌淡，苔薄，脉细弱。其证候是

50. 下列各项，不属痛经阳虚内寒证的主要症状是

- A. 小腹冷痛，喜按，得热则舒
- B. 经量少，经色黯淡
- C. 腰腿酸软
- D. 小便清长
- E. 平素带下量多，色黄稠有臭味

51. 患者经期小腹胀痛不适，有灼热感，平时小腹疼痛，经前加剧，经血量多或经期长，色黯红，质稠或夹较多黏液，平素带下量多，色黄质稠有臭味，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 两地汤
- C. 苍附导痰汤
- D. 清热调血汤
- E. 圣愈汤

52. A. 补肾益精，养血止痛 B. 补肾疏肝，行气止痛
C. 滋肾养阴，清热止痛 D. 疏肝清热，化瘀止痛
E. 理气行滞，化瘀止痛

(1) 患者经行时小腹绵绵作痛，伴腰骶酸痛，经色黯淡，量少，质稀薄，头晕耳鸣，面色晦暗，健忘失眠，舌质淡红，苔薄，脉沉细。治法是

(2) 患者经前或经期小腹胀痛拒按，经血量少，行而不畅，血色紫黯有块，块下痛暂减，

乳房胀痛，胸闷不舒，舌质紫黯，脉弦。其治法是

53. 患者经后两乳作胀作痛，乳房按之柔软无块，月经量少，色淡，两目干涩，咽干口燥，五心烦热，舌淡，少苔，脉细数。其治法是

- A. 补肾益气，固冲通络
- B. 疏肝和胃，固冲通络
- C. 滋阴益肾，固冲通络
- D. 滋肾养肝，和胃通络
- E. 疏肝健脾，和胃通络

肝气郁结证	肝肾亏虚证	胃虚痰滞证
经前乳房胀痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色暗红	经行或经后两乳作胀作痛，乳房按之柔软无块，月经量少，色淡	痛不可触衣。带下量多，色白稠黏(痰)，月经量少，色淡
小腹胀痛，胸闷胁胀，精神抑郁，时叹息	五心烦热	胸闷痰多，食少纳呆
苔薄白，脉弦	舌淡或舌红少苔，脉细数	舌淡胖，苔白腻，脉缓滑
疏肝理气，和胃通络	滋肾养肝，和胃通络	健胃祛痰，活血止痛
逍遥散	一贯煎或滋水清肝饮	四物汤合二陈汤去甘草

54. 患者近期因工作压力大，出现经行乳房胀满疼痛，伴乳头痒痛，甚则痛不可触衣，经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷胁胀，精神抑郁，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 逍遥散
- D. 血府逐瘀汤
- E. 调肝汤

55. A. 半夏白术天麻汤 B. 加味逍遥丸

C. 羚角钩藤汤 D. 通窍活血汤

E. 八珍汤

(1) 患者经期头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，面色不华，形体肥胖，舌淡胖，苔白腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

(2) 患者经行头痛，甚或颠部掣痛，头晕目眩，月经量稍多，色鲜红，烦躁易怒，口苦咽干，舌质红，苔薄黄，脉弦细数。治疗应首选的方剂是

肝火证	血瘀证	痰湿中阻证	血虚证
颠顶掣痛，月经色鲜红	痛如锥刺，经色紫暗有块	带多稠黏	绵绵作痛，月经量少色淡，质稀
烦躁易怒，口苦咽干。舌红苔薄黄，脉弦细数	舌暗有瘀点，脉细涩或弦涩	形体肥胖，胸闷泛恶。舌淡胖，苔白腻，脉滑	
清热平肝息风	化瘀通络	燥湿化痰，通络止痛	养血益气

羚角钩藤汤	通窍活血汤	半夏白术天麻汤	八珍汤
-------	-------	---------	-----

56. 下列各项，不属经行感冒邪入少阳证的主要症状是

- A. 经期出现寒热往来
- B. 经期期间，发热身痛，微恶寒
- C. 胸胁苦闷，口苦咽干
- D. 心烦欲呕，头晕目眩
- E. 默默不欲饮食

风寒证	风热证	邪入少阳证
每至经期期间， 发热，恶寒 ，无汗，鼻塞流涕，咽喉痒痛，咳嗽痰稀，头痛身痛。经血净后，诸证渐愈	每于经期期间， 发热身痛，微恶风 ，头痛汗出，鼻塞咳嗽，痰稠，口渴欲饮	经期出现 寒热往来，胸胁苦满 ，口苦咽干，心烦欲呕，头晕目眩，默默不欲饮食
舌淡红，苔薄白， 脉浮紧	舌红，苔黄， 脉浮数	舌红，苔薄白或薄黄， 脉弦或弦数
解表散寒，和血调经	疏风清热，和血调经	和解表里
荆穗四物汤	桑菊饮	小柴胡汤

57. 治疗经行感冒风热证，应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 小柴胡汤
- D. 九味羌活汤
- E. 荆穗四物汤

58. 患者每至经期期间，发热，恶寒，无汗，鼻塞流涕，咽喉痒痛，咳嗽痰稀，头痛身痛，舌淡红，苔薄白，脉浮紧。治法是

- A. 解表散寒，和血调经
- B. 疏风散寒，和血调经
- C. 疏风清热，和血调经
- D. 和解表里，和血调经
- E. 疏风解表，和血调经

59. 患者经行时腰膝、肢体、关节疼痛，得热痛减，遇寒痛甚，月经推迟，经量少，色暗，有血块；舌紫暗，有瘀斑，苔薄白，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A. 温经汤
- B. 小活络丹
- C. 通窍活血汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 趁痛散

血虚证	血瘀证（寒像明显）
经行时肢体疼痛麻木，肢软乏力， 月经量少，色淡，质薄	经行时腰膝、肢体、关节疼痛，得热痛减，遇寒疼甚，月经推迟，经量少， 色暗，或有血块

面色无华	
舌质淡红，苔白，脉细弱	舌紫暗，或有瘀斑，苔薄白，脉沉紧
养血益气，柔筋止痛	活血通络，益气散寒止痛
当归补血汤	趁痛散

60. A. 养血益气，柔筋止痛
 B. 补肾疏肝，和络止痛
 C. 滋肾养肝，通络止痛
 D. 疏肝理气，通络止痛
 E. 活血通络，益气散寒止痛
 1. 经行身痛血虚证的治法是
 2. 经行身痛血瘀证的治法是

61. 患者经行前后，大便泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷，舌淡，苔白，脉沉迟。治疗首选的方剂是
- A. 参苓白术散
 B. 八珍散
 C. 补中益气汤
 D. 四神丸合健固汤
 E. 左归丸

62. A. 养血益气，柔肝止泄
 B. 补肾疏肝，健脾止泻
 C. 健脾渗湿，理气调经
 D. 温阳补肾，健脾止泻
 E. 清热利湿，健脾止泻
 1. 经行泄泻脾虚证的治法是
 2. 经行泄泻肾虚证的治法是

63. 患者，女32岁，已婚。经行肢体肿胀按之随手而起，经色暗红有块，伴腕闷肋胀，善叹息，舌紫暗，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选
- A. 苓桂术甘汤
 B. 参苓白术散
 C. 八物汤
 D. 肾气丸
 E. 丹栀逍遥丸

经行浮肿：

脾肾阳虚证	气滞血瘀证
经行面浮肢肿，按之没指，晨起头面肿甚，月经推迟，经血量多，色淡，质薄	经行肢体肿胀，按之随手而起，经血色暗有块
腰膝酸软（肾虚） 腹胀纳减，大便溏薄（脾虚）	腕闷肋胀，善叹息
舌淡，苔白腻，脉沉缓，或濡细	舌紫暗，苔薄白，脉弦涩

温肾化气，健脾利水	理气行滞，养血调经
肾气丸合苓桂术甘汤	八物汤

64. A. 益气养血，健脾利水
 B. 理气行滞，养血调经
 C. 健脾渗湿，理气调经
 D. 温肾化气，健脾利水
 E. 清热利湿，健脾利水
- 经行浮肿脾肾阳虚证的治法是
 经行浮肿气滞血瘀证的治法是

65. 下列各项，属经行吐衄肺肾阴虚证的主要症状是

- A. 心烦易怒
 B. 两胁胀痛，口苦咽干
 C. 经期吐血、衄血，量少，色黯红，两颧潮红
 D. 头晕耳鸣
 E. 尿黄便结

经行吐衄：

肝经郁火证	肺肾阴虚证
经前或经期吐血、衄血，量较多，色鲜红，月经可提前、量少甚或不行	经前或经期吐血、衄血，量少，色暗红，月经每先期、量少
心烦易怒，或两胁胀痛，口苦咽干，头晕耳鸣，尿黄便结	平素可有头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，潮热咳嗽，咽干口渴
舌红，苔黄，脉弦数	舌红或绛，苔花剥或无苔，脉细数
清肝调经	滋阴养肺
清肝引经汤	顺经汤或加味麦门冬汤

66. 经行吐衄肺肾阴虚证的治法是

- A. 清肝调经
 B. 滋阴养肺
 C. 滋养肝肾
 D. 健脾摄血
 E. 滋阴降火

67. 下列各项，属经行吐衄肝经郁火证临床表现的是

- A. 吐血、衄血，量少，色暗红
 B. 吐血、衄血，量较多，色鲜红
 C. 手足心热，两潮红
 D. 潮热咳嗽，咽干口渴
 E. 舌红，苔花剥，脉细数

68. 经行口糜的相关脏腑是

- A. 肝、肾
 B. 肝、胃

- C. 肝、脾
D. 心、胃
E. 肾、胃

经行口糜：

阴虚火旺证	胃热熏蒸证
经期口舌糜烂，口燥咽干，月经量少，色红	经行口舌生疮，口臭，月经量多，色深红
五心烦热，尿少色黄	口干喜饮，尿黄便结
舌红，少苔，脉细数	舌苔黄厚，脉滑数
滋阴降火	清胃泄热
知柏地黄汤或上下相资汤	凉膈散

69. 下列各项，属经行口糜胃热熏蒸的主要症状是

- A. 经行口舌生疮，口臭
B. 月经量少，色红
C. 口燥咽干
D. 五心烦热
E. 尿少色黄

70. 患者经行身发红色风团、疹块，瘙痒不堪，感风遇热，其痒尤甚，月经多提前，量多，色红，口干喜饮，尿黄便结，舌红，苔黄，脉浮数。治疗首选的方剂是

- A. 当归饮子
B. 消风散
C. 举元煎
D. 大补元煎
E. 羌活胜湿汤

经行风疹块

内风	外风
血虚证	风热证
经行风疹频发，瘙痒难忍，入夜尤甚， 月经多推迟、量少色淡	经行身发红色风团、疹块，瘙痒不堪，感风遇热， 其痒尤甚，月经多提前、量多色红
面色不华，肌肤枯燥	口干喜饮，尿黄便结
舌淡红，苔薄，脉虚数	舌红苔黄，脉浮数
养血祛风	疏风清热
当归饮子	消风散

71. 下列各项，属经行风疹块血虚证临床表现的是

- A. 经行身发红色风团
B. 感风热，其痒尤甚
C. 月经提前，量多色红
D. 面色不华，肌肤枯燥
E. 舌红苔黄，脉浮数

72. 患者经期发热，腹痛，经色紫暗，夹有血块，舌暗或尖边有瘀点，脉沉弦数。治疗应首

选的方剂是

- A. 举元煎加味
- B. 蒿芩地丹四物汤加味
- C. 血府逐瘀汤加味
- D. 补中益气汤加味
- E. 桃红四物汤加味

经行发热：

肝肾阴虚证	血气虚弱证	瘀热壅阻证
经期或经后，午后潮热，月经量少，色红	经行或经后发热，热势不扬，动则自汗出，经量多，色淡质薄	经前或经期发热，腹痛，经色紫暗，夹有血块
两颧红赤，五心烦热，烦躁少寐	神疲肢软，少气懒言	
舌红而干，脉细数	舌淡，苔白润，脉虚缓	舌暗或尖边有瘀点，脉沉弦数
滋养肝肾，育阴清热	补益血气，甘温除热	化瘀清热
蒿芩地丹四物汤	补中益气汤	血府逐瘀汤

73. A. 血府逐瘀汤
B. 补中益气汤
C. 人参养荣汤
D. 蒿芩地丹四物汤
E. 桃红四物汤

1. 治疗经行发热血气虚弱证，应首选的方剂是
2. 治疗经行发热肝肾阴虚证，应首选的方剂是

74. A. 生铁落饮
B. 丹栀逍遥散
C. 羚角钩藤汤
D. 炙甘草汤
E. 甘麦大枣汤

治疗经行情志异常肝经郁热证，应首选的方剂是

治疗经行情志异常痰火上扰证，应首选的方剂是
升丹养肝

心血不足证	肝经郁热证	痰火上扰证
经前或经期，精神恍惚，心神不宁，无故悲伤，心悸失眠，月经量少色淡	经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，口苦咽干，胸胁胀满，月经量多，色深红	经前或经期精神狂躁，烦乱不安，或面红目赤，溲黄便结，月经量或偏少，色红或深红，质稠黏，或夹小血块
舌淡，苔薄白，脉细	舌红，苔黄，脉弦数	舌红，苔黄腻，脉滑数有力
补血养心，安神定志	清肝泄热，解郁安神	清热化痰，宁心安神
甘麦大枣汤合养心汤	丹栀逍遥散	生铁落饮

75. 患者经期精神恍惚，心神不宁，无故悲伤，心悸失眠，月经量少，色淡，舌淡，苔薄白，

脉细。治疗首选的方剂是

- A. 举元煎加减
- B. 八珍汤加减
- C. 大补元煎加减
- D. 甘麦大枣汤合养心汤加减
- E. 生铁落饮加减

属经行情志异常心血不足证（脏躁）。

- 76. A. 清肝泄热，解郁安神
- B. 补血养心，安神定志
- C. 涤痰活血，开郁安神
- D. 平肝潜阳，安神定志
- E. 清热化痰，宁心安神

3. 经行情志异常心血不足证的治法是

4. 经行情志异常痰火上扰证的治法是

77. 下列各项，属绝经前后诸证肾阳虚证的主要症状是

- A. 经行量多，经色淡黯
- B. 五心烦热，腰膝酸疼
- C. 头晕目眩，经色淡黯
- D. 舌红，少苔，脉细数
- E. 头部面颊阵发性烘热汗出

肾阴虚证	肾阳虚证	阴阳俱虚证	心肾不交证（增）
绝经前后，月经紊乱，月经提前量少或量多，或崩或漏，经色鲜红	经断前后，经行量多，经色淡暗，或崩中漏下	经断前后，月经紊乱，量少或多	绝经前后，月经周期紊乱，量少或多，经色鲜红，
头部面颊阵发性烘热， 五心烦热，腰膝酸疼 ，足跟疼痛，口干便结，尿少色黄	精神萎靡，面色晦暗， 腰背冷痛 ，小便清长，夜尿频数，或面浮肢肿	乍寒乍热，烘热汗出 ，头晕耳鸣，健忘， 腰背冷痛	心烦失眠， 心悸易惊 ，甚至情志失常，头晕健忘， 腰酸乏力
舌红少苔脉细数	舌淡，或胖嫩边有齿印，苔薄白，脉沉细弱	舌淡，苔薄，脉沉弱	舌红少苔，脉细数
滋养肾阴，佐以潜阳	温肾扶阳	阴阳双补	滋阴补血 养心安神
左归丸合二至丸	右归丸	二仙汤合二至丸	天王补心丹

78. 患者，女，49岁。月经或前或后，烘热出汗，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红苔薄，脉细数。治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 内补丸
- C. 肾气丸
- D. 两地汤合二至丸

E. 二仙汤合二至丸

79. 患者经断后阴道出血, 量少, 色淡, 质稀, 气短懒言, 神疲肢倦, 食少腹胀, 肋肋胀满, 舌苔薄白, 脉弦无力。其治法是

- A. 滋阴清热, 安冲止血
- B. 清热利湿, 止血凉血
- C. 健脾调肝, 安冲止血
- D. 清热凉血, 固冲止血
- E. 利湿解毒, 化瘀散结

脾虚肝郁证	肾阴虚证	湿热下注证	血热证	湿毒瘀结证
出血量少色淡, 质稀	经断后阴道出血量少, 色鲜红, 质稠	出血, 色红或紫红, 量多, 带下色黄有臭味	色深红, 质稠, 带下色黄, 有臭味	夹有杂色带下, 恶臭
气短懒言, 神疲肢倦	腰膝酸软, 潮热盗汗	大便不爽, 小便短赤	小便短赤, 大便秘结	
舌苔薄白, 脉弦无力	舌质偏红, 少苔, 脉细数	舌红, 苔黄腻, 脉弦细数	舌红, 苔黄, 脉弦滑	舌质暗有瘀斑, 苔白腻, 脉细弱
健脾调肝, 安冲止血	滋阴清热, 安冲止血	清热利湿, 止血凉血	清热凉血, 固冲止血	利湿解毒, 化瘀散结
安老汤	知柏地黄丸	易黄汤	益阴煎	萆薢渗湿汤合桂枝茯苓丸

80. 治疗经断复来湿热下注证, 首选

- A. 安老汤
- B. 知柏地黄丸
- C. 易黄汤
- D. 萆薢胜湿汤
- E. 龙胆泻肝丸

81. 患者 49 岁, 绝经后 1 年, 阴道出血, 量少, 淋漓不断, 夹有杂色带下, 恶臭, 小腹疼痛, 低热起伏, 神疲, 形体消瘦; 舌质暗, 苔白腻, 脉细弱。其证候是

- A. 脾虚肝郁证
- B. 肾阴虚证
- C. 血热证
- D. 湿毒瘀结证
- E. 湿热下注证

82. A. 宜补、宜固、宜涩

- B. 宜凉、宜宣、宜涩
- C. 宜清、宜运、宜补
- D. 宜泻、宜通、宜燥
- E. 宜运、宜升、宜燥

(1) 带下病治脾的主要治法是

(2) 带下病治肾的主要治法是

83. 患者带下量多, 清冷质稀, 绵绵不断, 腰痛如折, 便溏尿清, 舌淡, 苔薄白, 脉沉迟。其治法是

- A. 补肾益气, 利湿止带
- B. 健脾益气, 升阳除湿
- C. 温肾扶阳, 利湿止带
- D. 温肾培元, 固涩止带
- E. 温化寒湿, 固涩止带

84. 带下过多热毒蕴结证的带下特点是

- A. 带下色白或淡黄, 质稀薄
- B. 带下黄绿如脓, 臭秽难闻
- C. 带下绵绵不断, 质清稀如水
- D. 带下色黄或赤白相兼, 质稠
- E. 带下色白质黏, 呈豆渣样

脾虚证	肾阳虚证	阴虚夹湿证	湿热下注证	热毒蕴结证
带下量多, 色白质稀, 或如涕如唾, 绵绵不断	带下量多, 绵绵不断, 质清稀如水	带下量多, 阴部灼热感, 或阴部瘙痒	带下量多, 色黄质黏稠, 或带下色白质黏呈豆渣样	带下量多, 黄绿如脓, 或赤白相兼, 或五色杂下
纳少便溏	腰酸如折, 畏寒肢冷。苔白润, 脉沉迟	腰酸腿软, 五心烦热, 舌红, 苔少, 脉细数	舌红, 苔黄腻, 脉滑数	舌红, 苔黄或黄腻, 脉滑数
健脾益气, 升阳除湿	温肾培元, 固涩止带	滋肾益阴, 清热利湿	清利湿热, 佐以解毒杀虫	清热解毒
完带汤	内补丸	知柏地黄汤	止带方	五味消毒饮

85. 患者, 女, 40岁。带下量多, 色黄, 质黏稠、有臭气, 小腹作痛, 外阴瘙痒, 便秘溺赤, 舌红苔黄厚腻, 脉滑数。治疗选

- A. 完带汤
- B. 内补丸
- C. 知柏地黄汤
- D. 止带方
- E. 五味消毒饮

86. 患者带下量多, 色白, 质稀薄, 绵绵不断, 面色萎黄, 四肢倦怠, 纳少便溏, 舌淡胖, 苔腻, 脉细缓。治疗应首选的方剂是

- A. 完带汤
- B. 易黄汤
- C. 止带方
- D. 内补丸
- E. 二妙散

87. 患者带下全无，阴部萎缩，性交干涩困难，头晕耳鸣，腰膝酸软，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结，舌红，少苔，脉沉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 一贯煎
- B. 归肾丸
- C. 左归丸
- D. 小营煎
- E. 固阴煎

肝肾亏损证	血枯瘀阻证
带下过少，甚至全无，阴部干涩灼痛，或伴阴痒，阴部萎缩，性交疼痛，甚则性交干涩困难	带下过少，甚至全无，阴中干涩，阴痒。或经行腹痛，经色紫暗，有血块，肌肤甲错，或下腹有包块
头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结	或面色无华，头晕眼花，心悸失眠，神疲乏力
舌红，少苔，脉细数或沉弦细	舌质暗，边有瘀点瘀斑，脉细涩
滋补肝肾，养精益血	补血益精，活血化瘀
左归丸	小营煎

88. 下列各项，不属妊娠期用药慎用或禁用的药物是

- A. 峻下逐水之品
- B. 祛瘀破血之品
- C. 耗气散气之品
- D. 健脾和胃之品
- E. 辛热有毒之品

89. 患者停经 40 天，尿妊娠试验阳性，恶心呕吐 3 天，头晕厌食，食入即吐。首先应考虑的诊断是

- A. 子满
- B. 转胞
- C. 胞阻
- D. 恶阻
- E. 子气

90. A. 呕吐酸水或苦水

- B. 恶心欲吐，晨起尤甚
- C. 呕吐不食，或呕吐清涎
- D. 呕吐痰涎，胸膈满闷
- E. 食入即吐，恶闻油腻

(1) 恶阻肝胃不和证的辨证要点是

(2) 恶阻痰滞证的辨证要点是

91. 脾胃虚弱型妊娠恶阻，呕吐清涎，应首选

- A. 二陈丸

- B. 健脾丸
- C. 归脾汤
- D. 温胆汤
- E. 香砂六君子汤

脾胃虚弱证	肝胃不和证	痰滞证（新增）
妊娠早期，恶心呕吐不食，甚则食入即吐；口淡， 呕吐清涎 ，头晕体倦，脘痞腹胀	妊娠早期，恶心， 呕吐酸水或苦水 ，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息	妊娠早期， 呕吐痰涎 ，胸膈满闷，不思饮食，口中淡腻，头晕目眩，心悸气短，
舌淡，苔白，脉缓滑无力	舌淡红，苔微黄，脉弦滑	舌淡胖， 苔白腻，脉滑
健脾和胃 降逆止呕	清肝和胃 降逆止呕	化痰除湿 降逆止呕
香砂六君子汤	橘皮竹茹汤， 或苏叶黄连汤	青竹茹汤。

92. 患者女，32 岁，已婚，妊娠 2 个月，近日因恶阻而恶心呕吐，呕吐酸苦水不能进食，胸满胁痛、舌红苔黄，脉弦滑。证候是

- A. 肝胃不和
- B. 胃虚
- C. 胃热
- D. 痰滞
- E. 以上均非

93. 下列各项，属异位妊娠输卵管破裂时最主要的症状是

- A. 停经史和早孕反应
- B. 不规则阴道出血
- C. 突感一侧下腹撕裂样剧痛
- D. 晕厥与休克
- E. 急性贫血

94. A. 妊娠期间腰酸、腹痛，小腹坠胀，阴道不时下血

- B. 妊娠期，阴道少量出血、时下时止
- C. 孕后不规则出血，晕厥，突然一侧小腹撕裂痛
- D. 妊娠期间恶心呕吐，头晕目眩
- E. 孕后小腹疼痛，时作时止，反复发作

(1) 胎漏的主要症状是

(2) 异位妊娠的主要症状是

95. 患者妊娠 37 天，阴道少量出血 3 天，色深红，质稠，腰酸，口苦咽干，溲黄便结，舌红，苔黄，脉滑数。其治法是

- A. 补肾健脾，益气安胎
- B. 清热凉血，养血安胎
- C. 补气养血，固肾安胎

- D. 活血化瘀，补肾安胎
E. 疏肝理气，养血安胎

胎漏胎动不安：**保胎贵瘦**

肾虚证	血热证	气血虚弱证	血瘀证
妊娠期阴道少量下血， 色淡暗 ，腰酸，腹痛下坠，头晕 耳鸣	妊娠期阴道少量出血， 色深红或鲜红，质稠 ，或腰酸，溲赤便结	妊娠期阴道少量下血， 色淡红，质稀薄 ，腰酸， 面色㿔白，神疲肢倦	宿有癥积，孕后常腰酸腹痛下坠，或妊娠期跌扑闪挫
舌淡苔白，脉沉细滑， 尺脉弱	舌红苔黄，脉滑数	舌淡，苔薄白，脉细弱略滑	舌暗红或有瘀斑 ，脉弦滑或沉弦
补肾健脾，益气安胎	清热凉血，养血安胎	补气养血，固肾安胎	活血化瘀，补肾安胎
寿胎丸或滋肾育胎丸	保阴煎或当归散	胎元饮	桂枝茯苓丸合寿胎丸

96. 患者，女，32岁，已婚。孕后腰酸腹痛，胎动下坠，伴阴道少量出血，头晕耳鸣，小便频数，舌淡苔白，脉沉细滑。治疗应首选

- A. 加味圣愈汤
B. 胎元饮
C. 举元煎
D. 补肾安胎饮
E. 寿胎丸

97. A. 胎元饮

- B. 寿胎丸
C. 桂枝茯苓丸合寿胎丸
D. 滋肾育胎丸
E. 保阴煎

- (1) 治疗胎漏、胎动不安气血虚弱证，应首选的方剂是
(2) 治疗胎漏、胎动不安血热证，应首选的方剂是

98. 妊娠 12 周以内，胚胎自然殒堕者称

- A. 胎漏
B. 胞阻
C. 小产
D. 堕胎
E. 滑胎

99. 患者，女，33岁，已婚，孕三堕，头晕目眩，神疲乏力，心悸气短，舌质淡，苔薄白、脉细弱。治疗应首选

- A. 泰山磐石散
B. 寿胎丸
C. 肾气丸
D. 安奠二天汤

E. 补肾固冲丸

滑胎: **保安泰贵于补肾**

肾虚证			脾肾虚弱证	气血虚弱	血热证	血瘀证
肾气不足	肾阳亏虚	肾精亏损				
屡孕屡堕, 腰膝酸软 ,	屡孕屡堕, 腰膝酸软, 畏寒肢冷	屡孕屡堕, 腰膝酸软, 手足心热	屡孕屡堕, 腰膝酸软, 纳呆便溏 ,	屡孕屡堕, 乏力气短	屡孕屡堕 色深红质稠 , 口干	屡孕屡堕 素有癥瘕之疾,
舌淡苔薄白, 脉细滑, 尺沉弱	舌淡苔薄润, 脉沉迟或沉弱	舌红少苔, 脉细数	舌淡胖色暗, 脉沉细滑, 尺脉弱	舌淡, 苔薄白, 脉细弱	舌红苔黄, 脉弦滑数	舌紫暗有瘀斑 , 脉弦滑或涩
补肾健脾, 固冲安胎	温补肾阳, 固冲安胎	补肾填精, 固冲安胎	补肾健脾, 养血安胎	益气养血, 固冲安胎	清热养血, 滋肾安胎	祛瘀消癥, 固冲安胎
补肾固冲丸	肾气丸去泽泻	育阴汤	安奠二天汤	泰山磐石散	保阴煎合二至丸	桂枝茯苓丸合寿胎丸

100. 滑胎肾气不足证的中医治法是

- A. 温补肾阳, 固冲安胎
- B. 补肾填精, 固冲安胎
- C. 清热养血, 滋肾安胎
- D. 补肾健脾, 固冲安胎
- E. 益气养血, 固冲安胎

101. 患者屡孕屡堕 4 次, 现腰酸膝软, 足跟痛, 头晕耳鸣, 手足心热, 两颧潮红, 大便秘结, 舌红, 少苔, 脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 两地汤
- B. 固阴煎
- C. 保阴煎
- D. 育阴汤
- E. 寿胎丸

102. 胎萎不长的病因病机是

- A. 气血虚弱、脾肾不足、血寒宫冷
- B. 气血虚弱、肝肾精亏、脾肾阳虚
- C. 气血虚弱、脾肾不足、寒凝血瘀
- D. 脾肾不足、血寒宫冷、肝郁脾虚
- E. 血热扰胎、气血虚弱、脾肾不足

103. 患者妊娠 5 个月, 腹形小, B 超检查胎儿存活, 面色萎黄, 身体羸弱, 头晕心悸, 少气懒言, 舌质淡嫩, 苔少, 脉稍滑细弱无力。治疗应首选的方剂是

- A. 胎元饮
- B. 寿胎丸
- C. 四君子汤

D. 长胎白术散

E. 泰山磐石散

胎萎不长：后二证区别在有无**纳少便溏**的脾的定位

气血虚弱证	脾肾不足证	血寒宫冷证
妊娠腹形和宫体增大明显小于妊娠月份，胎儿存活， 面色萎黄或㿗白，少气懒言	妊娠腹形明显小于妊娠月份，胎儿存活， 腰膝酸软，纳少便溏 ，或形寒畏冷	妊娠腹形明显小于妊娠月份，胎儿存活， 形寒怕冷，腰腹冷痛，四肢不温
舌淡嫩，苔少，脉稍滑细弱无力	舌淡，苔白，脉沉迟	舌淡苔白，脉沉迟滑
补气益血养胎	补益脾肾，养胎长胎	温肾扶阳，养血育胎
胎元饮	寿胎丸合四君子汤	长胎白术散

104. 患者孕 5 月余，妊娠腹形明显小于妊娠月份，胎儿存活，形寒怕冷，腰腹冷痛，四肢不温，舌淡，苔白，脉沉迟滑。治疗应首选的方剂是

A. 寿胎丸

B. 右归丸

C. 安奠二天汤

D. 人参养荣丸

E. 长胎白术散

105. 患者孕 4 月余，妊娠腹形明显小于妊娠月份，胎儿存活，腰膝酸软，纳少便溏，形寒畏冷，手足不温，舌质淡，苔白，脉沉迟。首选的方剂是

A. 寿胎丸合四君子汤

B. 右归丸合八珍汤

C. 安奠二天汤合胎元饮

D. 保阴煎合四物汤

E. 长胎白术散

106. 下列各项，属于子满主症的是

A. 两脚肿胀，随按随起，小便如常

B. 自膝至脚肿，皮色不变，小便如常

C. 两脚浮肿，按之凹陷，小便短少

D. 腹大异常，通身浮肿，小便短少

E. 头面遍身浮肿，皮薄而光亮，小便短少

107. 下列各项，不属于子肿慎用药物的是

A. 滑利之品

B. 峻下之品

C. 寒凉之品

D. 温燥之品

E. 皮类利水药

108. 下列各项，属于子气临床表现的是

A. 两脚肿而皮薄者

- B. 自膝至足肿，小水长者
C. 妊娠期面目肿胀
D. 两脚肿而肤厚者
E. 妊娠期腹部增大，胸膈满闷

子肿：

脾虚证	肾虚证	气滞证
妊娠数月，面目四肢浮肿，或遍及全身，皮薄光亮， 按之凹陷不起，面色黄白无华，神疲气短 ，口淡而腻， 食少腹胀便溏 ，小便短少	妊娠数月，面浮肢肿，下肢尤甚， 按之如泥，腰酸乏力，下肢逆冷 ，小便不利	妊娠 3~4 月后，肢体肿胀，始于两足，渐及双腿，皮色不变， 随按随起 ，胸闷胁胀，头晕胀痛
舌淡体胖，苔白润或腻，脉缓滑	舌淡，苔白润，脉沉迟	苔薄腻， 脉弦滑
健脾利水	补肾温阳，化气利水	理气行滞，除湿消肿
白术散或健脾利水汤	真武汤或肾气丸	天仙藤散或正气天香散

经行浮肿：1 脾肾阳虚：肾气丸合苓桂术甘汤；2 气滞血瘀证：八物汤

109. 患者，女，23 岁，已婚，妊娠 7 个月，面浮肢肿，下肢尤甚，腰酸无力，下肢逆冷，舌淡苔白润，脉沉迟，其诊断

- A. 妊娠肿胀脾虚证
B. 妊娠肿胀肾虚证
C. 妊娠肿胀气滞证
D. 胎动不安肾虚证
E. 以上均非

110. 患者妊娠 30 周，头晕目眩，视物模糊，耳鸣失眠，心中烦闷，颜面潮红，口干咽燥，手足心热，舌红，少苔，脉弦数。应首选的方剂是

- A. 通窍活血汤
B. 羚角钩藤汤
C. 苓桂术甘汤
D. 半夏白术天麻汤
E. 杞菊地黄丸

阴虚肝旺证	脾虚肝旺证	气血虚弱证
妊娠中后期，头晕目眩，手足心热，口干咽燥	妊娠中晚期，头晕头重目眩，呕逆泛恶，倦怠嗜睡	妊娠后期，头晕目眩， 气短懒言，面色苍白 或萎黄
舌红或绛，少苔，脉弦数	苔白腻，脉弦滑	舌淡，脉细弱
育阴潜阳	健脾化湿，平肝潜阳	调补气血
杞菊地黄丸	半夏白术天麻汤	八珍汤

111. A. 子淋 B. 难产
C. 子气 D. 子肿
E. 转胞

- (1) 胎气下压，压迫膀胱，水道不通，可导致的病证是
(2) 热灼膀胱，气化失司，水道不利，可导致的病证是

112. 患者，女，23 岁，已婚，孕期突然小便频数而急，艰涩不利，灼热刺痛，胸闷食少，口干不欲饮。舌红苔黄腻，脉弦滑数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 知柏地黄汤
- C. 加味五苓散
- D. 清热通淋汤
- E. 以上均非

断病为子淋。辨证为湿热，用加味五苓散

阴虚津亏证	心火偏亢证	湿热下注证
妊娠期小便淋漓涩痛，午后潮热，手足心热， 舌红少苔，脉细滑而数	妊娠期小便艰涩刺痛， 面赤心烦，口舌生疮 舌红欠润，少苔或无苔，脉细数	妊娠期突感尿痛，带下黄稠量多 舌红苔黄腻，脉弦滑数
滋阴清热，润燥通淋	清心泻火，润燥通淋	清热利湿，润燥通淋
知柏地黄丸	导赤散	加味五苓散

**产后淋：1 阴虚火旺：益阴煎，或知柏地黄丸；
2 肝经郁热：沉香散； 3 湿热：加味五淋散**

113. 子淋阴虚津亏证的中医治法是

- A. 清心泻火，润燥通淋
- B. 清热利湿；润燥通淋
- C. 滋阴清热，润燥通淋
- D. 清热利湿，养阴通淋
- E. 交通心肾，清热利尿

114. 下列各项，属妊娠小便淋痛心火偏亢证临床表现的是

- A. 小便频数，淋漓涩痛，量少色淡黄，午后潮热
- B. 突感尿频尿急尿痛，尿意不尽，欲解不能
- C. 小便频数，尿短赤，艰涩刺痛，面赤心烦
- D. 小便频数不畅，继则闭而不通
- E. 小便不通，或频数量少，小腹胀急疼痛

115. 妊娠小便不通的常见病因是

- A. 气虚、气滞
- B. 寒湿、肾虚
- C. 肾虚、湿热
- D. 气虚、湿热
- E. 肾虚、气虚

妊娠小便不通（转胞）

肾虚证	气虚证
妊娠小便闭而不通， 腰膝酸软，畏寒肢冷 舌淡，苔薄润，脉沉滑无力	妊娠小便不通， 面色㿔白，神疲体倦 舌淡，苔薄白，脉虚缓滑

温肾补阳，化气行水	补中益气，导溺举胎
肾气丸加减	益气导溺汤

产后小便不通：

- 1 肾虚：济生肾气丸或金匮肾气丸；
- 2 气虚：补中益气汤或春泽汤；
- 3 血瘀：加味四物汤或小蓟饮子

116. 患者，女，26 岁，产后 15 天，高热寒战，热势不退，小腹疼痛拒按，恶露量多，色紫暗，气臭秽，心烦口渴，尿少量黄，大便燥结，舌红，苔黄脉数，有力其治法是

- A. 清热解毒，凉血化瘀
- B. 血热逐瘀，化脓散结
- C. 养血祛风，疏解表邪
- D. 活血化瘀，合营退热
- E. 补血益气。合营退热

产后发热：注意不同证型的**发热特点**

感染邪 毒 证	外感证	血瘀证	血虚证
产后 高热 寒战， 恶露色紫暗如败酱 ，味臭秽，	产后 恶寒发热 ，流清涕，头痛，	产后 寒热时作 ，恶露色紫暗有块	产后 低热 不退，喜按， 恶露色淡质稀
舌红苔黄，脉数有力	苔薄白，脉 浮紧	舌紫暗有瘀点，脉弦涩	舌淡，苔薄白，脉细数
清热解毒，凉血化瘀	养血祛风，疏解表邪	活血化瘀，和营退热	补血益气，和营退热
五味消毒饮合失笑散，或解毒活血汤	荆防四物汤	生化汤加味，或桃红消瘀汤	八珍汤

117. 治疗产后发热血瘀证，应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 补中益气汤
- D. 生化汤加味
- E. 桃红四物汤

118. 患者分娩后小腹疼痛，拒按，得热痛减，恶露量少，涩滞不畅，色紫暗有块，块下痛减；面色青白，四肢不温；舌质紫暗，脉沉紧或弦涩。其治法是

- A. 温经散寒，化瘀止痛
- B. 理气行带，活血化瘀
- C. 活血化瘀，温经止痛
- D. 养血活血，缓急止痛
- E. 温经散寒，理气行滞

产后腹痛：

气血两虚证	瘀滞子宫证
产后小腹隐隐作痛， 喜按喜揉 ，恶露 量少 ， 色淡红 ， 质稀 无块，面色苍白	产后小腹疼痛，拒按，恶露量少， 色紫暗有块 ，四肢不温

舌质淡，苔薄白，脉细弱	舌质紫暗，脉沉紧或弦涩
补血益气，缓急止痛	活血化瘀，温经止痛
肠宁汤，或内补当归建中汤，或当归生姜羊肉汤	生化汤，或散结定痛汤，或补血定痛汤

119. 患者产后 1 周，小腹隐隐作痛，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 肠宁汤
- B. 八珍汤
- C. 小建中汤
- D. 当归芍药散
- E. 人参养荣汤

120. 下列各项，属产后身痛血虚证临床表现的是

- A. 产后肢体关节疼痛，屈伸不利
- B. 产后身痛，尤见下肢疼痛、麻木
- C. 产后遍身关节酸楚
- D. 产后身痛，痛无定处
- E. 产后腰膝、足跟疼痛

- A. 产后肢体关节疼痛，屈伸不利：风寒证
- B. 产后身痛，尤见下肢疼痛、麻木：血瘀证
- C. 产后遍身关节酸楚：血虚证
- D. 产后身痛，痛无定处：风寒证之风邪为主
- E. 产后腰膝、足跟疼痛：肾虚证

121. A. 血瘀 B. 风寒
C. 肾虚 D. 血虚
E. 气虚

- (1) 产后肢体关节疼痛，屈伸不利，痛无定处，证候是
- (2) 产后遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸，证候是

122. 患者分娩数日后，肢体关节疼痛，屈伸不利，宛如针刺，得热则舒，伴恶寒怕风，脉濡细。其治法是

- A. 养血祛风，散寒除湿
- B. 祛风散寒，温经活血
- C. 温经散寒，化瘀止痛
- D. 养血祛风，温经止痛
- E. 养血温经，散寒止痛

产后身痛即产后痹证，此为**风寒证**。

血虚证	肾虚证	风寒证	血瘀证
产后 遍身关节酸楚疼痛 ，肢体 麻木 ； 面色萎黄	产 后腰膝、足跟疼痛 ， 头晕耳鸣 ，夜尿多	产后 肢体疼痛 ，或 痛无定处 ，或 冷痛剧烈 如针刺，或关节肿胀 重着	产后身痛， 尤见下肢疼痛麻木 ；恶露色紫 暗夹血块 ，
舌淡苔薄，脉细弱	舌淡暗，脉沉细弦	舌淡苔薄白，脉濡细	舌暗，苔白，脉弦 涩

养血益气， 温经通络	补肾养血， 强腰壮骨	养血祛风， 散寒除湿	养血活血， 化瘀祛湿
黄芪桂枝五物汤	养荣壮肾汤	独活寄生汤，或趁痛散、 防风汤	身痛逐瘀汤

区别各证型疼痛的部位

123. 患者产后 17 日恶露不止，量多，色淡红，质稀，无臭味，神疲懒言，四肢无力，小腹空坠，舌淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 补中益气汤
- C. 人参养荣汤
- D. 胶艾汤
- E. 生化汤

气虚证	血瘀证	血热证
恶露不尽，量多， 色淡，质稀，神疲懒言 ，小腹空坠	恶露过期不尽， 色暗有块	产后恶露过期不止， 量多，色紫红，质黏稠 ，有臭秽气
舌淡苔薄白，脉细弱	舌紫暗或边有瘀点，脉沉涩	舌红 ，脉细数
补气摄血固冲	活血化瘀止血	养阴清热止血
补中益气汤	生化汤	保阴煎

124. 患者，女 27 岁，已婚，产后，恶露 35 天不止，量时多时少，色暗有块，小腹疼痛拒按。舌紫暗，边有瘀点，脉沉涩。首选方剂是

- A. 生化汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 隔下逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 桃红四物汤

125. 患者，女，27 岁，已婚，产后恶露 35 天不止，色深红、质稠黏、有臭气，口燥咽干，舌红，脉虚细而数。应选

- A. 清热固经汤
- B. 保阴煎
- C. 清热调血汤
- D. 清经散
- E. 牡丹散

126. 患者产后乳汁分泌少，乳房胀硬、疼痛，乳汁稠，胸胁胀满，情志抑郁，食欲不振，舌质正常，苔薄黄，脉弦滑。首选方剂

- A. 逍遥散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 通乳丹
- D. 漏芦散
- E. 下乳涌泉散

气血虚弱证	肝郁气滞证	痰浊阻滞证
产后乳汁少，乳汁稀薄，乳房柔软； 面色少华，倦怠乏力	产后乳汁分泌少，乳房胀硬、疼痛； 伴胸胁胀满，情志抑郁	乳汁甚少，乳房硕大；形体 肥胖 ，
舌淡苔薄白，脉细弱	舌质正常，苔薄黄， 脉弦或弦滑	舌淡胖，苔腻，脉沉细
补气养血，佐以通乳	疏肝解郁，通络下乳	健脾化痰通乳
通乳丹	下乳涌泉散	苍附导痰丸合漏芦散

127. 患者产后心情抑郁，心神不安，噩梦纷纭，惊恐易醒，恶露量或多或少，色紫暗有块，胸闷纳呆，善太息，苔薄，脉弦。应首选的方剂是

- A. 八珍汤
- B. 逍遥散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 芎归泻心汤
- E. 养心汤

心脾两虚证	瘀血内阻证	肝郁气结证
产后焦虑忧郁， 心神不宁 ；伴 神疲乏力，面色萎黄，纳少便溏 ，脘闷腹胀	产后抑郁寡欢，默默不语； 恶露色紫暗有块 ，面色晦暗	产后心情抑郁，或噩梦纷纭，惊恐易醒； 善太息
舌淡，苔薄白，脉细弱	舌暗有瘀斑 ，苔白，脉弦或涩	苔薄， 脉弦
健脾益气，养心安神	活血逐瘀，镇静安神	疏肝解郁，镇静安神
归脾汤或养心汤或茯神散	调经散 或芎归泻心汤	逍遥散

128. 产后小便不通的基本病机是

- A. 气虚冲任不固
- B. 脾肺气虚，传导无力
- C. 膀胱气化失司
- D. 膀胱失约
- E. 脾肾阳虚，水湿不化

气虚证	肾虚证	血瘀证
产后小便不通， 倦怠乏力，少气懒言 ，语音低微	产后小便不通， 腰膝酸软	产时损伤膀胱，产后小便不通或点滴而下，尿色略混浊带 血丝
舌质淡，苔薄白，脉缓弱	舌质淡，苔白，脉沉细无力	舌正常或暗， 脉涩
补气升清，化气行水	温补肾阳，化气行水	活血化瘀，行气利水
补中益气汤或春泽汤	济生肾气丸或金匮肾气丸	加味四物汤或小蓟饮子

妊娠小便不通：

1. 气虚证：益气导溺汤

2. 肾虚证：肾气丸

129. 患者难产后小便不通或点滴而下，尿色略混浊带血丝，小腹胀急疼痛，舌质黯，脉涩。治疗应首选的方剂

- A. 当归芍药散
- B. 八物汤
- C. 金匮肾气丸
- D. 加味四物汤
- E. 真武汤

130. 治疗产后小便不通气虚证，应首选的方剂是

- A. 济生肾气丸
- B. 加味四物汤
- C. 化阴煎
- D. 补中益气汤
- E. 沉香散

131. 产后小便淋痛肝经郁热证，治疗首选

- A. 加味五淋散
- B. 加味四物汤
- C. 小蓟饮子
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 沉香散

产后小便淋痛：

湿热蕴结证	肾阴亏虚证	肝经郁热证
产后突感小便淋漓灼痛，尿黄赤或混浊，口渴不欲饮	产后小便灼热疼痛，伴腰酸膝软，手足心热	产后小便艰涩而痛，情志抑郁或心烦易怒，小腹胀满，甚或两胁胀痛，
舌红，苔黄腻，脉滑数	舌红，苔少，脉细数	舌红，苔黄，脉弦数
清热利湿通淋	滋肾养阴通淋	疏肝清热通淋
加味五淋散，或八正散，或分清饮	化阴煎，或知柏地黄汤	沉香散

妊娠小便淋痛：

1. 湿热下注证：加味五苓散
2. 阴虚津亏证：知柏地黄丸
3. 心火偏亢证：导赤散

132. A. 逐瘀止血汤

- B. 身痛逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 香棱丸
- E. 少腹逐瘀汤

(1) 治疗癥瘕气滞血瘀证应首选

(2) 治疗不孕瘀滞胞宫证应首选

癥瘕：都有瘀血，治法都有化瘀消瘕

气滞血瘀证	痰湿淤结证	湿热瘀阻证	肾虚血瘀证
下腹部结块，小腹胀满，经血量多有块，精神 抑郁 ，肌肤甲错	下腹结块，胸脘痞闷	下腹部肿块，热痛起伏， 痛连腰骶 ，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂；	下腹部结块，经色紫暗有块； 腰酸膝软，头晕耳鸣
舌紫暗，或有瘀斑， 脉沉弦涩	舌胖大，有瘀斑瘀点 ，苔白厚腻，脉弦滑或沉涩	舌暗红 ，有瘀斑，苔黄，脉弦滑数	舌暗，脉弦细
行气活血，化痰消癥	化痰除湿，活血消癥	清热利湿，化痰消癥	补肾活血，消癥散结
香棱丸，或大黄虻虫丸	苍附导痰丸合桂枝茯苓丸	大黄牡丹汤	补肾祛瘀方，或益肾调经汤

133. 患者下腹部有结块，触之不坚，固定难移，带下量多，胸脘痞闷，腰腹疼痛，舌体胖大，紫黯，苔白厚腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 苍附导痰丸合桂枝茯苓丸
- B. 血府逐瘀汤合温胆汤
- C. 膈下逐瘀汤合二陈汤
- D. 香棱丸合佛手散
- E. 启宫丸合桂枝茯苓丸

134. 癥瘕肾虚血瘀证的中医治法是

- A. 补肾活血，消癥散结
- B. 补肾益气，活血消癥
- C. 行气活血，化痰消癥
- D. 化痰除湿，活血消癥
- E. 补肾益精，化痰消癥

135. 急性盆腔炎的常见病因是

- A. 寒湿瘀滞
- B. 湿热瘀结
- C. 气滞血瘀
- D. 气虚血瘀
- E. 肝经湿热

热 毒 炽盛证	湿热 瘀结证
高热 腹痛，恶寒或寒战，下腹部疼痛拒按，咽干口苦，大便秘结，小便短赤，带下量多，色黄，或赤白兼杂，质黏稠，如脓血，味臭秽，月经量多或淋漓不净	下腹部疼痛拒按，或胀满， 热势起伏，寒热往来 ，带下量多、色黄、质稠、味臭秽，经量增多，经期延长，淋漓不止，大便溏或燥结，小便短赤
舌红，苔黄厚，脉滑数	舌红有瘀点 ，苔黄厚，脉弦滑
清热解毒，利湿排脓	清热利湿，化瘀止痛
五味消毒饮合大黄牡丹汤	仙方活命饮

136. 患者下腹部胀满，寒热往来，带下量多，色黄质稠，味臭秽，经量增多，经期延长，淋

漓不止，大便溏，小便短赤，舌红有瘀点，苔黄厚，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 五味消毒饮
- C. 大黄牡丹汤
- D. 仙方活命饮
- E. 龙胆泻肝汤

137. 患者，女，25岁，已婚，有盆腔炎病史，下腹部疼痛结块，缠绵日久，痛连腰骶，经行加重，经血量多有块，带下量多，精神不振，纳少乏力，舌质紫暗有瘀点，苔白，脉弦涩无力。治疗应首选

- A. 理冲汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 银甲丸

慢性盆腔炎：

湿热淤结证	气滞血淤证	寒湿凝滞证	气虚血瘀证
少腹部隐痛，或疼痛拒按， 痛连腰骶 ，带下量多，色黄，质黏稠；口干不欲饮	少腹部 胀痛或刺痛 ，经血量多有块，经行情志 抑郁 ，乳房胀痛	小腹冷痛，喜热恶寒， 得热痛缓 ，经血量少， 色暗 ，	下腹部疼痛结块，经血量多 有块 ， 疲乏无力 ，食少纳呆
舌体胖大， 色红，苔黄腻 ，脉弦数或滑数	舌体紫暗，有瘀斑、瘀点 ，苔薄， 脉弦涩	舌暗红，苔白腻，脉沉迟	舌体暗红，有瘀点瘀斑 ，苔白，脉 弦涩无力
清热利湿，化瘀止痛	活血化瘀，理气止痛	祛寒除湿，活血化瘀	益气健脾，化瘀散结
银甲丸或当归芍药散	膈下逐瘀汤	少腹逐瘀汤	理冲汤

助记：急请五大仙，慢发的话，少理淫哥

138. A. 肾气丸
B. 肝郁证
C. 温胞饮
D. 毓麟珠
E. 养精神玉汤

(1) 治疗不孕症肾阳虚证，应首选的方剂是

(2) 治疗不孕症肾气虚证，应首选的方剂是

不孕症：温少开始养苍玉

肾虚证			肝气郁结	瘀滞胞宫	痰湿内阻
肾气虚	肾阳虚	肾阴虚			
婚久不孕， 经色暗；腰膝酸软 ，	婚久不孕，经色淡暗， 小腹冷，腰膝酸软 ，	婚久不孕，经色较鲜红； 腰膝酸软，五心烦热 ，	婚久不孕；易怒，胸胁乳房胀痛，精神 抑郁	婚久不孕， 经色紫暗，有血块 ，	婚久不孕， 形体肥胖 ，胸闷泛恶，
脉沉细两	苔白，脉沉细	舌质稍红略干，	舌暗红， 脉弦	舌紫暗有瘀	舌淡胖， 苔

尺尤甚	尺弱	苔少，脉细或细数	细	点 ，脉弦或弦 细涩 。	白腻 ，脉滑。
补肾益气，温养冲任	温肾暖宫，调补冲任	滋肾养血，调补冲任	疏肝解郁，理血调经	逐瘀荡胞，调经助孕。	燥湿化痰，理气调经
毓麟珠	温胞饮，或右归丸	养精种玉汤	开郁种玉汤	少腹逐瘀汤	苍附导痰丸

139. 女子婚后未避孕，有正常性生活，丈夫查精液常规正常，同居 2 年未受孕者，称为

- A. 断绪
- B. 不育
- C. 全不产
- D. 绝对不孕
- E. 五不女

140. 患者结婚 4 年未孕，月经 38~45 天一行，量少色淡黯，性欲淡漠，带下量多，清稀如水，面部黯斑，腰酸腿软，头晕耳鸣，夜尿多，舌质淡黯，苔白，脉沉细尺弱。其治法是

- A. 滋补肝肾，理气调经
- B. 补肾疏肝，养血理脾
- C. 补肾养血，化瘀调经
- D. 滋肾养血，调冲益精
- E. 温肾暖宫，调补冲任

141. 不孕症痰湿内阻证的中医治法是

- A. 燥湿化痰，理气调经
- B. 理气化痰，调经促孕
- C. 燥湿行气，调经促孕
- D. 燥湿化痰，调经促孕
- E. 健脾化痰，理血调经

142. 下列各项，属于阴痒肝肾阴虚证临床表现的是

- A. 心烦易怒，小便赤黄
- B. 带下量多，色黄如脓
- C. 带下灰白如凝乳，味腥臭
- D. 会阴部肤色变浅白
- E. 舌体胖大，色红

阴痒：

肝经湿热证	肝肾阴虚证
阴部瘙痒难忍，坐卧不宁， 外阴皮肤粗糙增厚 ，有抓痕，黏膜充血破溃，或带下量多，色黄如脓，或呈泡沫米泔样，或灰白如凝乳，味腥臭；伴心烦易怒，胸胁满痛，口苦口腻，食欲不振，小便黄赤	阴部瘙痒难忍，干涩灼热，夜间加重，或 会阴部肤色变浅白 ， 皮肤粗糙 ，皲裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出， 腰酸腿软 ，口干不欲饮
舌体胖大， 色红 ， 苔黄腻 ， 脉弦滑	舌红苔少，脉细数无力
清热利湿，杀虫止痒	滋阴补肾，清肝止痒

龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤，外用蛇床子散	知柏地黄汤
--------------------	-------

143. 治疗阴疮热毒证，应首选的方剂是

- A. 阳和汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 托里消毒散
- D. 阴蚀生疮方
- E. 萆薢渗湿汤

阴疮：

热毒证	寒湿证
外阴部皮肤局限性鲜红肿胀，破溃糜烂，灼热结块，脓苔稠黏，或脓水淋漓；全身见身热心烦，口干纳少，便秘尿黄	阴部肌肤肿溃，触之坚硬，色晦暗不泽，日久不愈，脓水淋漓，疼痛绵绵；伴面色㿠白，精神不振，疲乏无力， 畏寒肢冷，食少纳呆
舌红苔黄腻，脉弦滑数	舌淡苔白腻，脉沉细缓
清热利湿，解毒消疮	温经散寒，除湿消疮
龙胆泻肝汤	阳和汤，或托里消毒散

144. 下列症状不属于阴挺气虚证的是

- A. 腰膝酸软
- B. 劳则加剧
- C. 带下色淡
- D. 带下量多
- E. 带下质稀

阴挺：

气虚证	肾虚证
子宫下移或脱出阴道口外，阴道壁松弛膨出，劳则加重，小腹下坠； 身倦懒言，面色不华，四肢乏力 ，小便频数，带下量多，质稀色淡	子宫下脱，日久不愈；头晕耳鸣， 腰膝酸软 冷痛，小腹下坠，小便频数，入夜尤甚，带下清稀
舌淡苔薄，脉缓弱	舌淡红，脉沉弱
补中益气，升阳举陷	补肾固脱，益气升提
补中益气汤	大补元煎

145. 计划生育工具避孕器的是

- A. 宫内节育器，阴茎套，阴道隔膜
- B. 宫内节育器，阴茎套，阴道药环
- C. 宫内节育器，阴茎套，避孕药物
- D. 宫内节育器，阴茎套，皮下注射
- E. 宫内节育器，阴茎套，避孕药膏

146. 下列避孕方法属于非工具避孕的是

- A. 绝育器
- B. 避孕套
- C. 阴道隔膜

- D. 避孕药
- E. 阴道环

147. 子宫内膜增生早期，其内膜厚度约为

- A. 1~2cm
- B. 3~4cm
- C. 5~6cm
- D. 7~8cm
- E. 9~10cm

148. 分泌晚期子宫内膜的厚度是

- A. 8mm
- B. 10mm
- C. 20mm
- D. 15mm
- E. 5mm