

初级护师考试：《答疑周刊》2022 年第 1 期

1. 【问题】低张性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织性缺氧的区别？

【解答】1.低张性缺氧：主要特点为**动脉血氧分压（PaO<sub>2</sub>）降低**，使动脉血氧含量（CaO<sub>2</sub>）减少，组织供氧不足。由于吸入氧气分压过低，外呼吸功能障碍，静脉血分流入动脉引起。常见于高原病、慢性阻塞性肺部疾病、先天性心脏病等。

2.血液性缺氧：由于**血红蛋白数量减少或性质改变**，造成血氧含量降低或血红蛋白结合的氧不易释放所致。常见于贫血、一氧化碳中毒、高铁血红蛋白症等。

3.循环性缺氧：由于**组织血流量减少**使组织供氧量减少所致。其原因为全身性循环性缺氧和局部性循环性缺氧。常见于休克、心力衰竭、栓塞等。

4.组织性缺氧：由于组织细胞**利用氧异常**所致。其原因为组织中毒、细胞损伤、呼吸酶合成障碍。常见于氰化物中毒、大量放射线照射等。【医学教育网原创】

2. 【问题】成人急性肾小球肾炎和慢性肾小球肾炎分别每日限盐多少克呀？

【解答】急性肾小球肾炎：少尿时，应限制水和钠盐的摄入，每日食盐量 1~2g，严重病例钠盐限制于每日 60mg/kg。

慢性肾小球肾炎：主要是限制蛋白质的摄入，若水肿、原发性高血压病人应限制盐<6g/d。


【医学教育网原创】

3. 【问题】心搏骤停患者最重要的诊断依据 意识突然丧失还是颈动脉搏动消失？

【解答】颈动脉搏动消失是心搏骤停患者最重要的诊断依据。


4. 【问题】枕左后位用钟表怎么看？

【解答】左枕后位就是胎儿枕骨在母亲骨盆的左后方，其枕骨应该在 3 点~6 点之间。



医学教育网  
www.med66.com

医学教育网  
www.med66.com



医学教育网  
www.med66.com

医学教育网  
www.med66.com

5. 【问题】不同年龄段小儿的心率？【医学教育网原创】

【解答】

年龄段	心率（次/分）
新生儿时期	120~140
1 岁以内	110~130
2~3 岁	100~120
4~7 岁	80~100
8~14 岁	70~90

医学教育网  
www.med66.com

医学教育网  
www.med66.com