

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2023年第7期

问题索引：

1. 【问题】不同孕期时终止妊娠的方法分别是什么？
2. 【问题】深静脉血栓为什么会导导致动脉缺血？
3. 【问题】肝硬化腹水病人可以补蛋白质吗？

具体解答：

1. 【问题】不同孕期时终止妊娠的方法分别是什么？

【解答】(1) 早期妊娠终止（人工流产术）

- 1) 人工流产负压吸引术：适用孕 6~10 周以内。休息 3 周。
- 2) 人工流产钳刮术：适用于妊娠 11~14 周者。休息 4 周。
- 3) 药物流产（米非司酮）：适用于妊娠 7 周内者。

(2) 中期妊娠终止：【医学教育网原创】妊娠 13 周至不足 28 周之间用人工方法终止妊娠。

(3) 中期妊娠引产术：常用于 15~28 周妊娠者。依沙吖啶引产和水囊引产。

2. 【问题】深静脉血栓为什么会导导致动脉缺血？

【解答】静脉血栓形成后，血栓远侧静脉回流受阻，使小静脉和毛细静脉淤血缺氧、渗透性增加，渗透压随静脉压上升而增高，血管内液体成分渗出到组织间隙造成肢体肿胀。静脉交通支亦因此开放，使浅静脉充盈。如病情恶化，深静脉有广泛血栓形成，伴有动脉痉挛时，可使肢体缺氧而发生疼痛，患肢皮肤呈青紫色，有时可导致肢体静脉型坏疽。

3. 【问题】肝硬化腹水病人可以补蛋白质吗？

【解答】肝硬化病人是需要限制蛋白质，但对于肝硬化放腹水的病人是需要补充蛋白质的。[医学教育网原创]

对肝硬化病人放腹水加补充白蛋白：单纯放腹水只能改善症状，2~3 天后腹水又会复原，放腹水加输注白蛋白用于治疗难治性腹水，每次放腹水 5000ml 左右，亦可一次放腹水 10000ml 甚至将腹水放完，同时，静脉输注白蛋白 40~

60g，可取得良好效果。



正保医学教育网

www.med66.com