

医学教育网口腔执业医师：《答疑周刊》2023 年第 9 期

- 问题索引：1. 口腔单纯疱疹病毒的传染方式？
2. 口腔单纯疱疹病毒治疗药物主要选？
3. 原发性疱疹性口炎常见于？

具体解答

1. 口腔单纯疱疹病毒的传染方式？

以下关于口腔单纯疱疹病毒传染方式错误的是

- A. 呼吸道
- B. 口腔
- C. 鼻
- D. 眼结膜
- E. 消化道

【答案】E

【解析】口腔单纯疱疹病[医学教育网]毒传染方式主要为直接经呼吸道、口腔、鼻、眼结膜、生殖器黏膜或破损皮肤进入人体。

2. 口腔单纯疱疹病毒治疗药物主要选？

不适用于口腔单纯性疱疹治疗的药物是

- A. 阿昔洛韦
- B. 利巴韦林
- C. 抗生素
- D. 干扰素
- E. 聚肌胞

【答案】C

【解析】口腔单纯性疱疹是由单纯[医学教育网]疱疹病毒（HSV）引起。治疗上主要选择抗病毒药物以及免疫治疗。病毒感染一般不使用抗生素（细菌）进行治疗。

3. 原发性疱疹性口炎常见于?

原发性疱疹性口炎好发人群是

- A. 老年人
- B. 6 岁以下儿童
- C. 青少年
- D. 更年期妇女
- E. 40 岁左右的中年人

【答案】B

【解析】以 6 岁以下儿童较多见，尤其是 6 个月至 2 岁更多，因为多数婴儿出生后，即有对抗单纯疱疹病毒的抗体[医学教育网]，这是一种来自母体的被动免疫，4~6 个月时自行消失，2 岁前不会出现明显的抗体效价。